

1. Вид гороха, у которого нет пергаментного слоя в стенах боба
 - A) сахарный
 - B) луцильный
 - C) кормовой
 - D) консервный
 - E) зерновой
2. Минимальная температура появления всходов хлопчатника, °C
 - A) 14-15
 - B) 20-25
 - C) 18-20
 - D) 21-22
 - E) 28-30
3. У подсолнечника зацветают первыми цветки
 - A) язычковые
 - B) срединные
 - C) трубчатые
 - D) периферийные
 - E) центральные
4. Виды арбуза
 - A) столовый, кормовой
 - B) овощной, кормовой
 - C) столовый, крупноплодный
 - D) кормовой, мускатный
 - E) пищевой, сахарный
5. Содержание масла в семенах современных сортов подсолнечника, в %
 - A) 25-28
 - B) 70-80
 - C) 30-45
 - D) 60-63
 - E) 50-52
6. Латинское название гороха
 - A) Ricinus
 - B) Carthamus tinctorius
 - C) Pisum sativum
 - D) Sinapis alba
 - E) Papaver somniferum
7. Зернобобовые культуры, которые выносят семядоли на поверхность почв при прорастании
 - A) фасоль, соя, люпин
 - B) чина, вика, нут
 - C) вика, горох, нут
 - D) вика, горох, соя
 - E) горох, соя, люпин

8. Количество колосков на уступе колосового стержня у многорядного ячменя
- A) 3
 - B) 2
 - C) 4
 - D) 1
 - E) 5
9. Способность растений переносить неблагоприятные условия в зимний и ранневесенний период называется
- A) морозобойностью
 - B) засухоустойчивостью
 - C) холодостойкостью
 - D) зимостойкостью
 - E) морозостойкостью
10. Для набухания семян пшеницы потребность в воде (в % от их абсолютно сухой массы)
- A) 55
 - B) 25
 - C) 44
 - D) 90
 - E) 150